

Dr Yves Chatillon, médecin-dentiste AMDG_SSO, diplôme fédéral
18, rue de Candolle, 1205 Genève,
Tel 022 329 36 16, Fax 022 329 37.70

Accidents dentaires

Accidents dentaires

Un comportement correct est décisif!

Chaque accident dentaire devrait immédiatement être annoncé au médecin-dentiste! Il est le seul à pouvoir décider si un traitement est nécessaire. Le médecin-dentiste puisse disposer des informations suivantes au téléphone déjà:

- Que s'est-il passé? Quand? Comment? Où?
- L'âge de l'enfant
- Quelles sont les dents touchées? (dents de lait ou dents définitives).
- En cas de lésion des tissus mous : (joues, nez, lèvres, langue, gencives)

Selon l'endroit et l'ampleur de la blessure, il faut immédiatement informer le médecin de famille et consulter le médecin-dentiste, voir le médecin de famille (en cas de blessure grave, voir le médecin de famille pour la vaccination).

En cas d'hémorragie importante, il faut fermement appliquer un mouchoir propre (procéder éventuellement à un pansement compressif). Dans la mesure du possible, il faut éviter de coucher le blessé à plat sur le dos.

En cas de signes de commotion cérébrale (vertiges, vomissements, pupilles inégalement dilatées), se rendre d'abord chez le médecin de famille. Une fois les lésions des tissus mous traitées par le médecin ou le service des urgences de l'hôpital, il faudra également consulter un médecin-dentiste pour traiter les éventuelles lésions dentaires.

Dents de lait

Attention: les dents de lait peuvent provoquer des lésions aux dents définitives qui n'ont pas encore fait leur éruption.



Fractures de la couronne d'une dent:

Plus la partie cassée de la dent est importante, plus il est urgent de consulter le médecin-dentiste.




Luxations dentaires (ébranlement de la dent):

Un traitement n'est pas urgent (consulter le médecin-dentiste dans les jours qui suivent).



Dents déplacées:

Dans ce cas, il est urgent de procéder à un traitement. Les dents concernées doivent être remises à leur juste place.



Dents extraites:

Il n'est pas urgent de procéder à un traitement étant donné que la plupart du temps il n'est pas utile de remettre une dent extraite dans son alvéole (consulter le médecin-dentiste dans les jours suivants).



Dents enfoncées:

Un traitement n'est pas toujours nécessaire. Mais il faut consulter un médecin-dentiste dans tous les cas! (Risque de lésion des dents définitives).


Dents permanentes

Attention: les chances de maintenir des dents permanentes accidentées sont augmentées par une intervention rapide et correcte (s



Fractures de la couronne d'une dent:

Plus la partie cassée de la dent est importante, plus il est urgent de consulter le médecin-dentiste (traitement au




Luxations dentaires (ébranlement de la dent) et dents déplacées:

Il est urgent de procéder à un traitement. La dent doit être remise à sa place le plus rapidement possible. Il est é
d'une attelle.



Dents extraites:

Lorsque les conditions sont favorables, il est possible qu'une dent extraite soit remise en place avec succès; pou
lait et se rendre le plus rapidement possible chez le médecin-dentiste. Ne toucher la dent que par la couronne! S
mouchoir humide (jamais en papier!). Ne pas nettoyer ni désinfecter la dent.



Dents enfoncées:

Il est urgent de consulter un médecin-dentiste. La dent doit être remise à sa place le plus rapidement possible. E
d'une attelle.